社外秘

ジーミスト長期安定性試験

成り行き試験	試験機関	試験方法
	三和薬品工業（株）	室温（1～30℃）で室内保管し、一定時間経過ごとに計測（医薬品の安定性試験ガイドラインを参考に実施）

2016年1月22日開始

試験No.	検体の種類	容量	公表濃度	初回測定濃度	6ヶ月	1年	※初回測定濃度より算出 1年経過残存率	1年6ヶ月	2年	※初回測定濃度より算出 2年経過残存率
A-2	ジーミスト	20L	50ppm	50.3ppm	49.9ppm	46.4ppm	92.2%	44.3ppm	43.1ppm	85.6%
B-2	ジーミスト100	20L	100ppm	108.2ppm	103.9ppm	103.7ppm	95.8%	99.4ppm	98.9ppm	91.4%
C-2	ジーミスト200	20L	200ppm	213.1ppm	204.7ppm	203.5ppm	95.4%	199.4ppm	194.5ppm	91.2%

※20L：ロンテナー個装ボックス

加速試験	試験機関	試験方法
	三和薬品工業（株）	検体を40℃±5℃の恒温器内で保管し、一定時間経過ごとに計測（医薬品の安定性試験ガイドラインを参考に実施）

2018年7月27日開始

試験No.	検体の種類	容量	保管条件	公表濃度	初回測定濃度	60日（1年相当）	※初回測定濃度より算出 1年経過残存率	120日（2年相当）	※初回測定濃度より算出 2年経過残存率
A-1	ジーミスト200	500ml	40℃	200ppm	219.1ppm	198.0pm	90.3%	185.1ppm	84.4%
A-2	ジーミスト100	300ml	40℃	100ppm	107.8ppm	97.5pm	90.4%	91.2ppm	84.6%
A-3	ジーミスト	300ml	40℃	50ppm	52.1ppm	46.9ppm	90.0%	41.9ppm	80.4%

※スプレーボトルにキャップを装着

※本報告書の全部、または一部の無断転載・転用を固くお断りします。
※試験機関へのお問い合わせは迷惑になるためご遠慮下さい。

JSHA 一般社団法人 日本空間衛生協会

社外秘

ジーミスト長期安定性試験

加速試験	試験機関	試験方法
	三和薬品工業（株）	検体を40℃±5℃の恒温器内で保管し、一定時間経過ごとに計測（医薬品の安定性試験ガイドラインを参考に実施）

2020年9月3日開始

試験No.	検体の種類	容量	公表濃度	初回測定濃度	60日（1年相当）	※初回測定濃度より算出 1年経過残存率	120日（2年相当）	※初回測定濃度より算出 2年経過残存率
E-1	ジーミスト	1Lパック	50ppm	52.1ppm	41.8ppm	80.3%	30.2ppm	58.0%
E-2		4Lパック	50ppm	52.1ppm	42.5ppm	81.6%	31.8ppm	61.0%
E-1	ジーミスト100	1Lパック	100ppm	108.0ppm	88.7ppm	82.2%	66.2ppm	61.3%
E-2		4Lパック	100ppm	108.0ppm	90.4ppm	83.7%	68.0ppm	63.0%
E-1	ジーミスト200	1Lパック	200ppm	218.2ppm	178.9ppm	82.0%	136.4ppm	62.5%
E-2		4Lパック	200ppm	218.2ppm	180.7ppm	82.8%	135.1ppm	61.9%

※本報告書の全部、または一部の無断転載・転用を固くお断りします。
※試験機関へのお問い合わせは迷惑になるためご遠慮下さい。

JSHA 一般社団法人 日本空間衛生協会